

| レジメン名         | 期間  | 投与方法                 | 投与日                    | 薬剤名 (一般名又は商品名)               | 1日投与量   |
|---------------|-----|----------------------|------------------------|------------------------------|---|
| TP            | 28日 | 点滴静注<br>点滴静注         | Day1・8・15<br>Day1・8・15 | トラスツズマブ<br>パクリタキセル           | 初回4mg/kg、2回目以降2mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup>                         |
| T-mab         | 21日 | 点滴静注                 | Day1                   | トラスツズマブ                      | 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg  |
| WeeklyPTX     | 28日 | 点滴静注                 | Day1・8・15              | パクリタキセル                      | 80mg/m <sup>2</sup>   |
| EC            | 21日 | 点滴静注<br>点滴静注         | Day1<br>Day1           | エピルビシン<br>エンドキサン             | 90mg/m <sup>2</sup><br>600mg/m <sup>2</sup>                         |
| nab-PTX       | 21日 | 点滴静注                 | Day1                   | アブラキサン                       | 260mg/m <sup>2</sup>  |
| FEC(75)       | 21日 | 点滴静注<br>点滴静注<br>点滴静注 | Day1<br>Day1<br>Day1   | エピルビシン<br>エンドキサン<br>フルオロウラシル | 75mg/m <sup>2</sup><br>500mg/m <sup>2</sup><br>500mg/m <sup>2</sup> |
| TC            | 21日 | 点滴静注<br>点滴静注         | Day1<br>Day1           | ドセタキセル<br>エンドキサン             | 75mg/m <sup>2</sup><br>600mg/m <sup>2</sup>                         |
| DTX           | 21日 | 点滴静注                 | Day1                   | ドセタキセル                       | 75mg/m <sup>2</sup>   |
| PER+T-mab+DTX | 21日 | 点滴静注<br>点滴静注<br>点滴静注 | Day1<br>Day1<br>Day1   | ペルツズマブ<br>トラスツズマブ<br>ドセタキセル  | 初回840mg、2回目以降420mg<br>初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg<br>75mg/m <sup>2</sup>   |
| T-mab+S-1     | 21日 | 点滴静注<br>経口           | Day1<br>2週1休           | トラスツズマブ<br>TS-1              | 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup>                         |
| T-mab+DTX     | 21日 | 点滴静注<br>点滴静注         | Day1<br>Day1           | トラスツズマブ<br>ドセタキセル            | 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg<br>75mg/m <sup>2</sup>                         |
| T-mab+カベシタビン  | 21日 | 点滴静注<br>経口           | Day1<br>2週1休           | トラスツズマブ<br>カベシタビン            | 初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg<br>1250mg/m <sup>2</sup> /回                    |
| GEM           | 21日 | 点滴静注                 | Day1・8                 | ゲムシタビン                       | 1250mg/m <sup>2</sup>   |
| CPT-11        | 28日 | 点滴静注                 | Day1・8・15              | イリリチカン                       | 100mg/m <sup>2</sup>  |
| PER+T-mab     | 21日 | 点滴静注<br>点滴静注         | Day1<br>Day1           | ペルツズマブ<br>トラスツズマブ            | 初回840mg、2回目以降420mg<br>初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg                          |
| フェスゴ配合皮下注     | 21日 | 皮下注                  | Day1                   | ペルツズマブ、トラスツズマブ               | 初回1N、2回目以降MA  |