

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名（一般名又は商品名）	1日投与量
FOLFOX6	14日	点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1 Day1	オキサリプラチン レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
FOLFOX6 + B-mab	14日	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	ベバシズマブ オキサリプラチン レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	5mg/kg 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
FOLFOX6 + P-mab	14日	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	ベクティビックス オキサリプラチン レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	6mg/kg 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
FOLFIRI2	14日	点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1 Day1	イリテカン レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
FOLFIRI2 + B-mab	14日	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	ベバシズマブ イリテカン レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
FOLFIRI2 + P-mab	14日	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	ベクティビックス イリテカン レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
フルオウラシル+レボ ホリナート	14日	点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1	レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
フルオウラシル+レボ ホリナート+B-mab	14日	点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1 Day1	ベバシズマブ レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
FOLFIRI2 + C-mab	14日	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1,8 Day1 Day1 Day1 Day1	アビタックス イリテカン レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
FOLFOX6 + C-mab	14日	点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 持続静注	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	アビタックス オキサリプラチン レボ ホリナート フルオウラシル（急速） フルオウラシル（持続）	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>
IRIS	28日	点滴静注 経口	Day1 2週2休	イリテカン TS-1	125mg/m <sup>2</sup> 80~120mg/Body
IRIS + P-mab	28日	点滴静注 点滴静注 経口	Day1 Day1 2週2休	ベクティビックス イリテカン TS-1	6mg/kg 125mg/m <sup>2</sup> 80~120mg/Body
IRIS + B-mab	28日	点滴静注 点滴静注 経口	Day1 Day1 2週2休	ベバシズマブ イリテカン TS-1	5mg/kg 125mg/m <sup>2</sup> 80~120mg/Body

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名 (一般名又は商品名)	1日投与量
ゼロダ + B-mab	21日	経口 点滴静注	2週1休 Day1	カベシタビン ベパシズマブ	1000mg/m <sup>2</sup> /回 7.5mg/kg
XELOX	21日	点滴静注 経口	Day1 2週1休	オキサリプラチン カベシタビン	130mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup> /回
XELOX + B-mab	21日	点滴静注 点滴静注 経口	Day1 Day1 2週1休	ベパシズマブ オキサリプラチン カベシタビン	7.5mg/kg 130mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup> /回
XELOX + P-mab	21日	点滴静注 点滴静注 経口	Day1 Day1 2週1休	ペクティビックス オキサリプラチン カベシタビン	9mg/kg 130mg/m <sup>2</sup> 1000mg/m <sup>2</sup> /回
SOX	21日	点滴静注 経口	Day1 2週1休	オキサリプラチン TS-1	130mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>
SOX + P-mab	21日	点滴静注 点滴静注 経口	Day1 Day1 2週1休	ペクティビックス オキサリプラチン TS-1	6mg/kg 130mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>
SIRB	21日	点滴静注 点滴静注 経口	Day1 Day1 2週1休	ベパシズマブ イリリチン TS-1	7.5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>
XELIRI	21日	点滴静注 経口	Day1 2週1休	イリリチン カベシタビン	200mg/m <sup>2</sup> 800mg/m <sup>2</sup> /回
XELIRI + B-mab	21日	点滴静注 点滴静注 経口	Day1 Day1 2週1休	ベパシズマブ イリリチン カベシタビン	7.5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 800mg/m <sup>2</sup> /回
P-mab	14日	点滴静注	Day1	ペクティビックス	6mg/kg
UFT/ユゼル + B-mab	28日	点滴静注 経口 経口	Day1,15 3週1休 3週1休	ベパシズマブ UFT ユゼル	5mg/kg 300mg/m <sup>2</sup> /日 75mg/日
ロンサ-7 + B-mab	14日	点滴静注 経口	Day1 Day1~5、8~12	ベパシズマブ ロンサ-7	5mg/kg 70mg/m <sup>2</sup> /日
BRAF + MEK + C-mab	7日	点滴静注 経口 経口	Day1 連日 連日	アビタックス ビラフトニ メトニ	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> 300mg × 1回 45mg × 2回